



Detaillierte Prognose für *Plasmopara viticola* und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Rommersheim, 01.01.2026 00:00 - 09.01.2026 01:00

Erstellt 02.01.2026 07:02 Daten vorhanden bis: 02.01.2026 06:10 Wettervorhersage bis: 09.01.2026 01:00

Keimbereitschaft: 0 %
Austrieb (BBCH11): - Wachstum angegeben für: Spätburgunder
pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Spor-angien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei BN.	Wachstum		Bemerkungen
				02.01.	09.01.	Min	Ø	Max			Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						0,0	0,7	2,2		11,7	3	0	0
02.01						-1,0	1,1	2,2	1,8	8,0	14	0	0
03.01						-2,6	-1,2	0,8		9,0	0	0	0
04.01						-2,8	-1,4	0,8			0	0	0
05.01						-5,2	-3,3	-1,0		2,0	0	0	0
06.01						-6,0	-3,6	-1,1	0,2	2,0	0	0	0
07.01						-5,6	-3,7	-2,2	0,1	1,0	0	0	0
08.01						-5,1	-3,7	-2,6	1,0		0	0	0
09.01						-4,3	-4,0	-3,8			0	0	0

Sporangiendichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke

! gering

!! mittel

!!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com