



## Detaillierte Prognose für *Plasmopara viticola* und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland  
Berechnung: Sporangiendichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Grevenmacher, 01.01.2026 00:00 - 07.01.2026 01:00

Erstellt 31.12.2025 07:04 Daten vorhanden bis: -

Wettervorhersage bis: 07.01.2026 01:00

Keimbereitschaft: 0 % Wachstum angegeben für: Spätburgunder  
Austrieb (BBCH11): - pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Spor-angien-dichte	Infektion	Inkubation	Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei BN.	Wachstum Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	Bemerkungen
				-	07.01.	Min	Ø	Max			
01.01						-0,1	0,8	1,8	0,2	0	0
02.01						-0,5	1,2	2,4	0,3	1,0	2
03.01						-2,7	-1,1	0,5	0,9		0
04.01						-2,9	-1,2	1,2	0,5	1,0	0
05.01						-3,0	-2,1	-0,4			0
06.01						-4,7	-3,4	-2,2	1,4	5,0	0
07.01						-2,3	-2,3	-2,2	0,5	1,0	0

Sporangiendichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm<sup>2</sup> Blattfläche \* 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke

! gering

!! mittel

!!! hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, [www.geosens.com](http://www.geosens.com)