

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope Schweiz und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Deutschland
Berechnung: Sporangiedichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Stadtbredimus, 01.01.2026 00:00 - 10.03.2026 01:00

Erstellt 03.03.2026 16:40 Daten vorhanden bis: 03.03.2026 15:00

Wettervorhersage bis: 10.03.2026 01:00

Keimbereitschaft: 9 % Wachstum angegeben für: Spätburgunder
Austrieb (BBCH11): - pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				03.03.	10.03.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
01.01						-1,1	0,0	1,2	0,1	9,5	1	0	0	
02.01						-2,1	0,3	1,9	3,0	15,8	7	0	0	
03.01						-5,1	-2,6	-0,4	0,6	7,5	0	0	0	
04.01						-6,6	-2,6	-0,3	0,1	5,5	0	0	0	
05.01						-5,1	-4,4	-3,2	0,1	8,7	0	0	0	
06.01						-4,7	-2,8	-0,4	0,1	1,8	0	0	0	
07.01						-3,7	-3,2	-1,9	0,7	8,2	0	0	0	
08.01						-1,8	0,5	3,8	10,7	23,8	0	0	0	
09.01						1,0	3,4	6,1	11,5	22,3	27	0	0	
10.01						-2,6	-0,7	1,7	3,5	19,5	19	0	0	
11.01						-3,5	-2,0	-0,9	0,3		0	0	0	
12.01						-0,9	2,5	6,1	6,2	18,5	62	0	0	
13.01						5,5	7,2	9,5	0,6	9,7	120	0	0	
14.01						6,4	7,7	9,2	1,9	14,5	58	0	0	
15.01						7,4	8,3	10,1	0,9	10,7	93	0	0	
16.01						4,7	7,9	9,8	0,3	11,5	35	0	0	
17.01						2,6	6,5	11,4	0,7	11,8	86	0	0	
18.01						-1,0	0,6	2,4	0,1	5,2	11	0	0	
19.01						0,0	1,1	1,6			0	0	0	
20.01						-1,6	-0,7	0,4		5,0	0	0	0	
21.01						-2,6	0,4	5,4		12,2	0	0	0	
22.01						-3,8	0,4	3,4	0,2	15,3	12	0	0	
23.01						1,2	3,6	7,4		5,0	9	0	0	
24.01						-1,3	1,1	3,5	2,2	23,8	25	0	0	
25.01						-4,3	-2,3	-0,5	0,1	20,0	0	0	0	
26.01						-2,1	1,2	4,3		14,8	5	0	0	
27.01						0,0	2,9	5,2	5,7	18,7	38	0	0	
28.01						3,3	4,3	6,1	6,6	23,8	142	0	0	
29.01						0,2	3,0	4,9	2,5	16,5	183	0	0	
30.01						-1,1	1,4	4,5	0,9	20,3	28	0	0	
31.01						4,1	5,1	6,2	1,9	23,8	149	0	0	
01.02						3,7	4,9	6,5	0,9	22,8	220	0	0	
02.02						1,9	3,8	5,1	6,5	12,5	94	0	0	
03.02						1,2	3,4	6,3	5,6	20,0	57	0	0	
04.02						-1,1	2,5	5,5	0,1	16,7	76	0	0	
05.02						-0,9	2,4	6,8	0,1	13,2	12	0	0	

Station: Stadtbredimus, 01.01.2026 00:00 - 10.03.2026 01:00

Erstellt 03.03.2026 16:40

Daten vorhanden bis: 03.03.2026 15:00

Wettervorhersage bis: 10.03.2026 01:00

Keimbereitschaft: 9 %

Wachstum angegeben für:

Spätburgunder

Austrieb (BBCH11): -

pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				03.03.	10.03.	Min	Ø	Max		Std.	Grad-std. bei BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²	
06.02						1,4	3,8	6,8	3,3	23,8	91	0	0	
07.02						1,5	6,3	8,7	0,5	19,8	187	0	0	
08.02						-1,1	1,9	4,8	0,2	21,8	60	0	0	
09.02						1,0	2,8	3,7		14,8	20	0	0	
10.02						2,5	5,9	9,1	2,8	21,5	128	0	0	
11.02						7,4	8,8	11,5	11,9	23,0	249	0	0	
12.02						6,9	7,8	10,0	11,7	18,3	173	0	0	
13.02						5,3	6,9	9,3	1,6	10,3	48	0	0	
14.02						-0,1	1,7	5,2	0,6		0	0	0	
15.02						-1,5	0,1	2,0	6,6	6,5	0	0	0	
16.02						0,0	3,5	5,8	8,2	20,8	52	0	0	
17.02						-0,2	3,1	6,5	0,4	8,5	33	0	0	
18.02						-2,2	0,9	4,5	3,0	13,3	4	0	0	
19.02						1,4	3,2	6,0	3,5	17,2	33	0	0	
20.02						1,7	3,5	5,9	1,0	6,5	22	0	0	
21.02						5,4	8,3	10,6	3,0	12,8	53	0	0	
22.02						8,9	9,7	10,9	8,6	22,8	132	0	0	
23.02						8,0	9,6	11,6	1,7	12,7	170	0	0	
24.02						7,8	10,6	12,5	2,5	15,3	114	0	0	
25.02						6,2	9,4	14,1	0,1	14,8	122	0	0	
26.02						3,0	9,5	16,6	0,3	10,3	88	0	0	
27.02						5,7	11,9	18,1		7,2	57	0	0	
28.02						3,1	9,0	12,0		2,3	5	0	0	
01.03						-1,6	5,7	12,7		10,8	16	0	0	
02.03						-1,5	6,9	15,3		9,0	8	0	0	
03.03						1,3	7,1	18,2		8,7	30	0	0	
04.03						2,4	8,6	16,4		1,0	3	0	0	
05.03						2,4	8,5	16,5			0	0	0	
06.03						2,1	9,2	18,1			0	0	0	
07.03						3,0	9,9	18,8		1,0	3	0	0	
08.03						3,2	9,9	17,6			0	0	0	
09.03						5,6	11,1	17,7			0	0	0	
10.03						9,6	9,8	10,0			0	0	0	

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben.

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage.

Dunkelgrau: Daten aus Wettervorhersage.

Infektion: Infektionsstärke I gering II mittel III hoch

Realisierung und Programmierung: Geosens GmbH, www.geosens.com